



РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА ЗА ПЕРИОД С 2019 ПО 2021 ГОДЫ: МОНОЦЕНТРОВОЕ РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Бекарысова Д. С.

Южно-Казахстанская медицинская академия

Шымкент, Казахстан

Введение. В настоящее время по данным ВОЗ, 1,71 миллиард людей по всему миру страдают патологиями опорно-двигательного аппарата, важную этиологическую составляющую данной группы заболеваний составляют ревматические заболевания (РЗ). РЗ распространены повсеместно и не ограничиваются определенными географическими рамками. Данное исследование посвящено структуре и половозрастной составляющей ревматических заболеваний в южном регионе Казахстана.

Материалы и методы. Ретроспективное моноцентровое исследование основано на изучении историй болезней пациентов. Объектом исследования был определен суставной синдром ревматологического генеза у пациентов южного региона Казахстана.

Результаты. Среди 370 человек, было выявлено пациентов с ревматоидным артритом – 183, системной красной волчанкой (СКВ) – 47, остеоартрозами (ОА) – 42, анкилозирующим спондилоартритом (АСА) – 31, системной склеродермией (ССД) – 30, реактивным артритом (РеА) – 18, подагрическим артритом (ПоА) – 14, псориатическим артритом (ПсоА) – 3, дерматомиозитом (ДМ) – 2. Процентное распределение ревматических заболеваний среди мужчин представлено следующими статистическими данными: 40,91% с РА, 1,82% с СКВ, 10% с ОА, 25,45% с АСА, 0,91% с ССД, 6,36% с РеА, 12,73% с ПоА, 1,82% с ПсоА, 0% с ДМ. Среди женского населения процентное распределение ревматических заболеваний было следующим: 53,08% с РА, 17,31% с СКВ, 11,92% с ОА, 1,15% с АСА, 11,15% с ССД, 4,23% с РеА, 0% с ПА, 0,38% с ПсоА, 0,77% с ДМ. Процентное распределение заболеваний в возрастной группе от 18 до 44 лет составило: макс. 42,59% для РА, мин. 0,62% для ПсоА и ДМ; в группе от 45 до 59 лет составило: макс. 57,62% для РА, мин. 0,66% для ДМ; в группе от 60 лет: макс. 47,37% для РА, мин. 0% для РеА, ПсоА, ДМ. Распределение ревматических заболеваний среди городских жителей составило: 38,30% с РА, 15,96% с СКВ, 15,96% с ОА, 5,32% с АСА, 11,70% с ССД, 6,38% с РеА, 2,13% с ПоА, 3,19% с ПсоА, 1,06% с ДМ. Ревматические заболевания среди сельских жителей были распределены следующим образом: 53,26% с РА, 11,59% с СКВ, 9,78% с ОА, 9,42% с АСА, 6,88% с ССД, 4,35% с РеА, 4,35% с ПА, 0% с ПсоА, 0,36% с ДМ.

Заключение. В рамках исследования было выявлено, что в структуре ревматических заболеваний в южном регионе РК преобладает РА, затем СКВ, ОА, далее почти с равным количеством АСА и ССД, на шестом месте РеА, после которого следуют ПоА, ПсоА и ДМ. В гендерном соотношении было выявлено, что РА, СКВ, ОА, ССД, ДМ чаще страдают женщины. В это же время было зафиксировано, что мужчины чаще, чем женщины болеют АСА, РеА, ПоА, ПсоА. Было отмечено, что одновременно во всех возрастных группах преобладающим заболеванием является РА. Так было выявлено, что ревматоидным артритом, анкилозирующим спондилоартритом, подагрическим артритом чаще болеют сельские жители, в то время как городские жители чаще страдают от системной красной волчанки, остеоартритов, системной склеродермии, реактивных артритов, псориатических артритов и дерматомиозитов.